

<p><b>Biotipo</b></p>	<p><b>Lanero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tamaño mediano a grande.</b></li> <li>• <b>Cuerpo largo y angosto.</b></li> <li>• <b>Cabeza saliente de la línea del lomo.</b></li> <li>• <b>Lomo NO recto.</b></li> <li>• <b>Costillas NO arqueadas.</b></li> <li>• <b>Escaso desarrollo muscular.</b></li> <li>• <b>Patas largas y finas.</b></li> </ul>	<p><b>Carnicero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Chicos.</b></li> <li>• <b>Cortos y anchos.</b></li> <li>• <b>Cilíndricos.</b></li> <li>• <b>La cabeza apenas sobresale.</b></li> <li>• <b>Cabeza y cuello más cortos y anchos.</b></li> <li>• <b>Lomo recto.</b></li> <li>• <b>Patas cortas y separadas.</b></li> <li>• <b>Costillas bien arqueadas.</b></li> <li>• <b>Gran desarrollo muscular.</b></li> </ul>
<p><b>Razas</b></p>	<p><b>MERINO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En España surgen las distintas variedades de merino.</li> <li>• Australia es el país que más la desarrollo y la mejoro genéticamente, siendo el principal país productor.</li> <li>• Especializada en la producción de lana.</li> <li>• De elevada rusticidad y adaptación a distintos ambientes.</li> <li>× <b>Cuerpo y vellón:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Cara despejada.</li> <li>✚ 2-3 pliegues en el pecho.</li> <li>✚ Mucosas y pezuñas claras.</li> <li>✚ Machos con cuernos (variedad mocha).</li> <li>✚ Vellón denso.</li> <li>✚ Diámetro de la fibra: 19-23 micrones.</li> <li>✚ Largo de la mecha: 8-10 cm.</li> </ul> </li> <li>× <b>Adaptación y difusión:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Rustica.</li> <li>✚ Adaptada a zonas secas.</li> <li>✚ Sensible a la humedad.</li> <li>✚ Muy caminadora.</li> <li>✚ Raza prioritaria en el país.</li> <li>✚ Concentrada en Patagonia.</li> </ul> </li> <li>× <b>Reproducción y producción:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Amplia estación de cría.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>TEXEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En nuestro país esta raza a presentado distocias por el elevado peso al nacer de los corderos.</li> <li>× <b>Cuerpo y vellón:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Sin cuernos.</li> <li>✚ Mucosas y pezuñas oscuras.</li> <li>✚ Cara y miembros sin lana.</li> <li>✚ Diámetro de la fibra: 27-30 micrones.</li> <li>✚ Largo de la mecha: 10-15 cm.</li> <li>✚ Lana más áspera.</li> </ul> </li> <li>× <b>Adaptación y difusión:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Criada en climas frescos y con abundante alimentación (originaria de Holanda).</li> <li>✚ Pocas cabañas en el país.</li> <li>✚ Escasa difusión, pero aumentando.</li> </ul> </li> <li>× <b>Reproducción y producción:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Marcada estación de cría.</li> <li>✚ Muy prolífica.</li> <li>✚ Muy buena aptitud materna.</li> <li>✚ Gran tendencia carnicera.</li> <li>✚ Carne magra.</li> <li>✚ Buen rendimiento en faena.</li> <li>✚ Alto peso adulto.</li> </ul> </li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ No mellicera.</li> <li>✚ Poca habilidad materna.</li> <li>✚ Corderos nacen con poco peso.</li> <li>✚ Lana fina, la de mayor valor comercial.</li> <li>✚ Pobre productora de carne.</li> <li>✚ Poco precoz.</li> <li>✚ Carne más magra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Lana áspera (mantas y sombrería).</li> </ul>
<p><b>IDEAL (polwarth)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Originaria de Australia.</li> <li>• Cruza 75% merino y 25% Lincoln.</li> <li>✚ <b>Cuerpo y vellón:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Mucosas y pezuñas claras.</li> <li>✚ Sin cuernos.</li> <li>✚ Diámetro de fibra: 23-26 micrones.</li> <li>✚ Largo de la mecha: 10-12 cm.</li> </ul> </li> <li>✚ <b>Adaptación y difusión:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Más resistente a humedad que merino.</li> <li>✚ Rustica, prospera en campos pobres.</li> <li>✚ Difundida en el norte de Entre Ríos, y sur de Corrientes (campos altos y pedregosos).</li> </ul> </li> <li>✚ <b>Reproducción y producción:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Algo más estacional que merino.</li> <li>✚ Prioritariamente lanera.</li> <li>✚ Lana un poco más gruesa que merino y mas amarillenta.</li> <li>✚ Corderos un poco más precoces que merino.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>HAMPSHIRE DOWN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ <b>Cuerpo y vellón:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Perfil romano.</li> <li>✚ Morro, orejas, rodilla y pezuñas oscuras.</li> <li>✚ Sin cuernos.</li> <li>✚ Vellón denso.</li> <li>✚ Diámetro de la fibra: 27-31 micrones.</li> <li>✚ Largo de la mecha: 5-7 cm.</li> </ul> </li> <li>✚ <b>Adaptación y difusión:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Núcleos en Entre Ríos, Bs. As., Santa Fe, La Pampa y Córdoba.</li> </ul> </li> <li>✚ <b>Reproducción y producción:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Muy mellicera.</li> <li>✚ Gran aptitud materna.</li> <li>✚ Gran precocidad.</li> <li>✚ Tendencia al engrasamiento.</li> <li>✚ Excelente capón.</li> <li>✚ Bajo peso de vellón y lana de poco valor.</li> </ul> </li> </ul>

<p><b>Biotipo</b></p>	<p><b>Lechero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Grandes.</b></li> <li>• <b>Largos y estrechos.</b></li> <li>• <b>Cabeza sobresaliente de la línea del lomo.</b></li> <li>• <b>Cabeza y cuello largos y estrechos.</b></li> <li>• <b>Patas largas y finas.</b></li> <li>• <b>Tren posterior más desarrollado para dar lugar a la ubre.</b></li> <li>• <b>Poco desarrollo muscular.</b></li> <li>• <b>Huesos salientes, bien angulosas.</b></li> <li>• <b>Ubre y patas sin lana.</b></li> </ul>	<p><b>Peletero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Medianos a grandes.</b></li> <li>• <b>Cuerpo largo.</b></li> <li>• <b>Perfil convexo.</b></li> <li>• <b>Orejas grandes y caídas.</b></li> <li>• <b>Patas largas y finas.</b></li> <li>• <b>Cola bien ancha, acumula grasa.</b></li> <li>• <b>Poco desarrollo muscular.</b></li> <li>• <b>Color variable en distintos tonos dentro del negro.</b></li> <li>• <b>Doble cubierta de pelo y lanilla.</b></li> <li>• <b>Raza: Karakul.</b></li> </ul>
<p><b>Razas</b></p>	<p><b>FRISONA (Milchschaaf o East Friesian)</b></p> <p>× <b>Cuerpo y vellon:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Cara, patas y cola sin lana.</li> <li>✚ Mucosas y pezuñas claras.</li> <li>✚ Sin cuernos.</li> <li>✚ Gran tamaño y alto peso corporal.</li> <li>✚ Diámetro de la fibra: 30-32 micrones.</li> </ul> <p>× <b>Adaptación y difusión:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Criada en climas frescos y con abundante alimentación.</li> <li>✚ Poco difundida en el país.</li> </ul> <p>× <b>Reproducción y producción:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Precocidad sexual.</li> <li>✚ Fértil y muy prolífica.</li> <li>✚ Mayor producción lechera: 500-600 litros en 250 días, en raza pura y en otros países.</li> <li>✚ Corderos precoces.</li> <li>✚ Lana crusa media.</li> </ul> <p><b>PAMPINTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raza desarrollada por el INTA Anguil.</li> <li>• Adaptación a la región pampeana de la raza Frisona, con incorporación de un 25% de sangre Corriedale, debido a los problemas de adaptación por neumonías de la raza Frisona.</li> </ul>	<p><b>KARAKUL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Originaria de Asia central, regiones secas, de clima riguroso y pobre vegetación.</li> <li>• Posee una cola gorda, en donde almacena grasa.</li> <li>• Animal rustico de tamaño medio.</li> <li>• De color negro, los machos con cuernos.</li> <li>• No poseen aptitud carnícera.</li> <li>• Lana y pelo negro, cruza gruesa de escaso valor comercial.</li> <li>• El objetivo de producción es el Astracan, la piel del cordero nonato o recién nacido.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Animal de porte grande y alargado.</li> <li>• Totalmente blanco, sin cuernos y descubierto en la cara y patas.</li> <li>• Elevada prolificidad, precocidad y producción lechera.</li> <li>• Producción de 350-400 litros de leche en 270 días.</li> <li>• Buena aptitud carnicera.</li> <li>• Producción en Bs. As. y La Pampa.</li> </ul>	
<p><b>MANCHEGA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Originaria de la región de La Mancha en España.</li> <li>• Produce en áreas agrestes, secas y con altas temperaturas.</li> <li>• En nuestro país se adaptaron al NOA, Córdoba, Mendoza, San Luis y San Juan.</li> <li>• Producción de 130-150 litros de leche en 150 días, con un tenor graso del 7%.</li> <li>• Vellón de bajo peso y una finura de entre 25-28 micrones.</li> </ul>	

Biotipos	Razas de aptitud doble propósito
Razas	<p><b>CORRIEDALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Originaria de Nueva Zelanda.</li> <li>• Se cría en todas las regiones del país.</li> <li>• Mayor distribución a nivel mundial.</li> <li>• Posee sangre 50% Merino y 50% Lincoln</li> </ul> <p>× <b>Cuerpo y vellón:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Copete sobre la cabeza.</li> <li>✚ Mucosas y pezuñas negras.</li> <li>✚ Sin cuernos.</li> <li>✚ Vellón semicerrado.</li> <li>✚ Diámetro de la fibra: 25-29 micrones.</li> <li>✚ Largo de la mecha: 10-15 cm.</li> </ul> <p>× <b>Adaptación y difusión:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Adaptación a climas diversos.</li> <li>✚ Segunda raza del país.</li> <li>✚ Mayor distribución geográfica del país.</li> <li>✚ Criada en pradera pampeana, litoral y Patagonia.</li> </ul> <p>× <b>Reproducción y producción:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Estacionalidad intermedia.</li> <li>✚ Algo más prolífica que merino.</li> <li>✚ Doble propósito equilibrado.</li> <li>✚ Lana crusa fina.</li> <li>✚ Muy buena productora de corderos precoces y capones medianos.</li> </ul> <p><b>ROMNEY MARSH</b></p> <p>× <b>Cuerpo y vellón:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Sin cuernos.</li> <li>✚ Mucosas negras.</li> <li>✚ Pezuñas negras, fuertes (resistente a pietin).</li> <li>✚ Diámetro de la fibra: 28-35 micrones.</li> <li>✚ Largo de la mecha: 15-20 cm.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>× <b>Adaptación y difusión:</b><ul style="list-style-type: none"><li>✚ Zonas húmedas y bajas.</li><li>✚ Resistente a pietin.</li><li>✚ Tercera en importancia en el país.</li><li>✚ En cuenca del Salado, litoral y Tierra del Fuego.</li></ul></li><li>× <b>Reproducción y producción:</b><ul style="list-style-type: none"><li>✚ Marcada estación de cría (otoño).</li><li>✚ Mellicera.</li><li>✚ Gran aptitud materna.</li><li>✚ Tendencia carnicera.</li><li>✚ Lana cruce media.</li></ul></li></ul>
<p><b>LINCOLN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>× <b>Cuerpo y vellón:</b><ul style="list-style-type: none"><li>✚ Sin cuernos.</li><li>✚ Pezuñas y mucosas oscuras.</li><li>✚ Vellón abierto, brillante, puntas en tirabuzón.</li><li>✚ Diámetro de la fibra: 35-50 micrones.</li><li>✚ Largo de la mecha: 15-25 cm.</li></ul></li><li>× <b>Adaptación y difusión:</b><ul style="list-style-type: none"><li>✚ Exige campos fértiles y buen clima.</li><li>✚ Poco importante numéricamente.</li><li>✚ Argentina, principal núcleo genético.</li></ul></li><li>× <b>Reproducción y producción:</b><ul style="list-style-type: none"><li>✚ Muy estacional (otoño).</li><li>✚ Mejorando aspectos reproductivos.</li><li>✚ Productora de borregos y capones para el mercado (mayor engrasamiento).</li><li>✚ Lana gruesa para tapices y alfombras.</li></ul></li></ul>